



FARMACOTERAPIA CUTANATĂ ANTIBACTERIANĂ



Autor: RUSANOVSKI Andreia

Conducător științific: SCUTARI Corina, dr. șt. fram., conferențiar universitar

Catedra de farmacologie și farmacie clinică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

INTRODUCERE

Infecțiile cutanate bacteriene sunt frecvente și pot evolua sever. Rezistența microbiană îngreunează alegerea terapiei. Tratamentul eficient necesită selectarea corectă a antibioticelor, evaluarea sensibilității și adaptarea terapiei la severitatea infecției. Utilizarea rațională a antimicrobienulelor este esențială pentru eficacitate și prevenirea rezistenței.


SCOP

Analiza principiilor moderne de farmacoterapie în infecțiile cutanate bacteriene, cu accent pe eficacitatea și siguranța agenților antimicrobieni utilizați.

MATERIALE ȘI METODE

A fost realizat un studiu bibliografic bazat pe:

- ghiduri clinice internaționale (IDSA, ECDC);
- articole științifice și metaanalize recente;
- analiza antibioticelor topice și sistemice folosite în dermatologie;
- criteriile de alegere a terapiei în funcție de severitatea și etiologia infecției



CUVINTE-CHEIE

Infecții cutanate • Antibiotice • Rezistență bacteriană • Terapie rațională • Eficacitate

REZULTATE

Antibiotice uzuale

Beta-lactamine, macrolide, lincosamide: eficacitate 80–90%

Eficiente în celulită, impetigo, foliculite ușoare

Infecții cu tulpini rezistente MRSA

Clindamicină ~85%, Trimetoprim-sulfametoxazol 80–90%, Linezolid >95% (doar cazuri severe)

Terapie topică


Mupirocină 85–90% în 5–7 zile

Acid fusidic: eficient, risc rezistență la utilizări repetate


Durata și ajustarea tratamentului

5–10 zile, adaptată după răspuns clinic și sensibilitate bacteriană


Psoriazis




Urticarie




Eczemă



Lichen plan



Acnee



Vitiligo



CONCLUZII

Farmacoterapia cutanată antibacteriană trebuie individualizată în funcție de etiologie, severitatea infecției și caracteristicile pacientului. Alegerea rațională a antimicrobienulelor, utilizarea terapiei topice în formele ușoare și monitorizarea atentă a evoluției clinice contribuie la eficiența tratamentului, prevenirea complicațiilor și reducerea riscului de rezistență bacteriană.