



ASISTENȚA FARMACEUTICĂ A BOLILOR PALIATIVE



Autor: CEAICA Adelina, student

Conducător științific: SCUTARI Corina, dr. șt.med., conferențiar universitar

Catedra de farmacologie și farmacie clinică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

INTRODUCERE

Îngrijirea paliativă în Republica Moldova este organizată din anul 2000 la nivel de servicii non-statale. În ultimii ani au fost create programe educaționale pentru instituțiile de învățământ. Studiile despre datele contemporane referitor la verigele principale care protejează organismul împotriva suferințelor cauzate de boli paliative prezintă interes major pentru practica medicală și farmaceutică.

SCOPUL LUCRĂRII

Studiul particularităților epidemiologice, clinice și asistenței farmacoterapeutice ale bolilor paliative.

MATERIAL ȘI METODE

Studiul clinic a fost efectuat la Fundația Filantropică Medico-Sociale „Angelus Moldova”. Metodologia de lucru a constat în analiza a 97 cazuri de boli paliative în perioada anului 2022-2023 la centrul Moldova Angelus. Datele obținute au fost prelucrate statistic și interpretate având în vedere vârsta, sexul, statutul profesional, evoluția bolii, boli concomitente și tratamentul efectuat.


CUVINTE -CHEIE

Boli paliative, dureri, tratament, analgezice.


REZULTATE

În baza rezultatelor obținute s-a constatat, majoritatea cazurilor de boli paliative au fost cauzate de cancer de glandă mamară, cancer pulmonar și cancer al colului uterin. În jur de 70 la sută cazuri de adresare, boala a fost deja în stadiul III B sau chiar IV, când șansele de supraviețuire la 5 ani sunt minime sau chiar inexistente. Cele mai comune semne și simptome caracteristice bolii au fost dureri în oase, osalgii violente (100%); artralgi (26%); greață, vomă, constipații (84%), anorexie (83%), pierdere în greutate (48%), febră (25%), slăbiciune generală (76%). Tratamentul bolilor paliative a constat în administrarea analgezicelor opiacee (92%), glucocorticoizilor (82%), diureticelor (34%), anxioliticelor (28%), hipnoticelor (22%), antidepresivelor (15%) și laxativelor (38%).

Repartizarea pacienților cu boli paliative după diagnosticul de bază



Utilizarea analgezicelor la bolnavii paliativi



CONCLUZII

Îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul adecvat.